

Met deze behandeling ontstaat een pijnstilling door het elektrisch beïnvloeden van de zenuw. Er kan de eerste 2-3 weken na de facetdenervatie wat pijn zijn door de behandeling. Hiervoor kan u een lichte pijnstiller innemen. Het pijnstillend effect van de behandeling ontstaat meestal na 2 à 3 weken. Uw normale activiteiten mag u de volgende dag hervatten.

Risico's of nevenwerkingen

De behandeling is over het algemeen veilig. Aan elke behandeling zijn er echter risico's en nevenwerkingen verbonden en bestaat er een kleine kans op complicaties.

Als mogelijke nevenwerking kan er na-pijn ontstaan, maar ook tijdelijke gevoelsvermindering. Deze gevoelsvermindering treedt op in de buurt van de behandelde zenuwbanen.

Aanraking geeft hierbij soms een vreemd gevoel. Na enkele weken keert het gevoel vanzelf terug. Een enkele keer kan er een bloedvatje geraakt worden, waardoor er een bloeding kan ontstaan. Als u één of meerdere van deze symptomen heeft na de infiltratie, dient u contact op te nemen met het secretariaat van de pijnkliniek.

Contact

Heeft u nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen met:

secretariaat pijnkliniek
T+ 32(0)50 63 35 46



campus Knokke-Heist (8300)

Graaf Jansdijk 162 - T +32 (0)50 63 31 11

campus Blankenberge (8370)

Dr. F. Verhaeghestraat 1 - T +32 (0)50 43 41 11

campus Maldegem (9990)

Stationsstraat 27 - T +32 (0)50 40 40 70

www.azzeno.be

Facetdenervatie (RF)



AS0002646/M1701



Facetdenervatie

Facetdenervatie is de behandeling van de steungewrichtjes van de wervelkolom.

(of percutane behandeling met continue toegediende radiofrequente elektrische stroom ter hoogte van de bezuwering van de facetgewrichten)

Deze folder geeft u informatie over de behandeling van pijnklachten die uitgaan van de steungewrichtjes (facet) in de wervelkolom. Dit gebeurt door de zenuwbanen op die plaats te verwarmen met radiofrequente (RF) elektrische stroom. De behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de nek, borstwervel of lage rug.

Vorbereiding

De facetdenervatie vindt steeds plaats op de campus Blankenberge. Na opname begeeft u zich naar de dagkliniek.

U wordt best vergezeld van een chauffeur. Na de behandeling is het mogelijk dat u zich suf voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan om nadien zelf met de auto te rijden.

Minstens 10 dagen op voorhand dient de inname van bloedverdünnende middelen gestopt te worden (bv. Marcoumar®, Sintrom®, Ticlid®, Aspirine®, Plavix®,...). Gelieve dit zeker op voorhand te bespreken met uw huisarts.

U hoeft niet nuchter te zijn. Uw thuismedicatie mag u ook innemen.

Gelieve vooraf aan uw arts te melden indien u:

- Last heeft van allergie voor medicijnen, contrastvloeistof of jodium;
- Lijdt aan suikerziekte of een hartkwaal;
- Bloedverdünnende medicatie inneemt;
- Mogelijks zwanger bent.

Behandeling


Voorafgaand aan de facetdenervatie kreeg u een proefinfiltratie die de diagnose bevestigde, maar ook snel uitgewerkt was. De facetdenervatie zal voor een langdurig effect zorgen.

De behandeling gaat door in de operatiezaal. U ziet daar onder meer een speciale behandeltafel, een televisie-monitor en een röntgenapparaat (= Rx-stralen).

De arts ontsmet eerst de huid. Dit voelt koud aan. Vervolgens wordt de plaats van de behandeling steriel afgedekt. De arts verdooft de prikplaatsen (3) van de huid en onderhuidse weefsels. Deze injectie kan als prikkend ervaren worden.

Als dit is ingewerkt, brengt de arts onder Rx-stralen de elektrode (een soort naaldje) in, vlak bij de zenuwtakjes van het facetgewricht.

Daarna wordt door de elektrode een zwakke, niet schadelijke elektrische stroom gestuurd. Daardoor ervaart u tintelingen of een drukkend gevoel. Het is van belang dat u met woorden de locatie aangeeft, dus niet de plaats aanwijzen anders maakt u deze onsteriel.



Vervolgens wordt de plaats van de elektrode ten opzichte van de zenuwen voor de spieren gecontroleerd. Dit gebeurt met een andere stroom. Hierdoor ontstaan spierbewegingen (kloppende gevoel) in uw arm of uw been.

Wanneer de elektrode zich op de juiste plaats bevindt (soms is er een correctie van de positie nodig) begint de echte behandeling.

Via de ingebrachte elektrode wordt een hoogfrequente elektrische stroom gestuurd. Deze behandeling duurt enkele minuten.

Nadien wordt het naaldje en de elektrode verwijderd. Tijdens de hele procedure blijft de verpleegkundige bij u.

Na de behandeling

Na de behandeling moet u voor controle nog minstens 1 uur in het ziekenhuis blijven. Terug op de dagkliniek worden dan de verdere afspraken gemaakt voor bijkomende behandelingen of voor consultatie.

Uw totale verblijf in het ziekenhuis zal enkele uurtjes in beslag nemen.