

Risico's of nevenwerkingen

- Tijdelijke nabehandelpijn (gedurende enkele dagen tot tweetal weken). Hiervoor mag u klassieke pijnstillers nemen.
- Gevoelsvermindering ter hoogte van het huidgebied van de behandelde zenuw(wortel). Dit verdwijnt meestal na een aantal maanden.
- Lokale bloeding
- Bloeduitstorting wanneer een bloedvatje geraakt is bij het prikken.

Resultaten


Het uiteindelijke resultaat kan pas definitief beoordeeld worden na minstens vier weken.

Afhankelijk van patiënt tot patiënt, en afhankelijk van welke structuur behandeld werd, treedt pijnstilling op die varieert van een paar maanden tot meer dan een jaar. Wanneer na verloop van tijd de klachten opnieuw optreden, kan de behandeling herhaald worden.

Contact

Heeft u vragen, aarzel niet om contact op te nemen met:

Secretariaat pijnkliniek:
T+ 32(0)50 63 35 46



campus Knokke-Heist

Graaf Jansdijk 162
8300 Knokke-Heist
T +32 (0)50 63 31 11
F +32 (0)50 63 35 19
www.azzeno.be

campus Blankenberge

Dr. F. Verhaeghestraat 1
8370 Blankenberge
T +32 (0)50 43 41 11
F +32 (0)50 43 45 19
www.azzeno.be

Gepulseerde radiofrequente zenuwblokkade (PRF)



Gepulseerde radiofrequente zenuwblokkade

U krijgt binnenkort een PRF als behandeling van een zenuw(wortel) in de rug (lumbaal) of de nek (cervicaal). Met deze tekst willen we u wat meer uitleg geven over dit type pijnbehandeling.

Wat is een PRF

PRF staat voor 'Pulse Radio Frequentie stroom'. Hierbij wordt de zenuw(wortel) verwarmd tot maximaal 42°C. Bedoeling is om de geleiding van de zenuwprikkel te beïnvloeden. De zenuw wordt niet beschadigd.

Radiofrequente stroombehandelingen worden pas uitgevoerd nadat eerst een duidelijke (tijdelijke) pijnverbetering heeft plaatsgevonden na een proefbehandeling. Dit betekent dat er eerst een proefbehandeling voorafgaat aan de PRF. Indien er beterschap optreedt na deze proefbehandeling, wordt de effectieve PRF binnen de drie maanden uitgevoerd.


Vorbereiding

De PRF vindt steeds plaats op de campus Blankenberge. Na opname begeeft u zich naar de dagkliniek.

Maximaal 10 dagen op voorhand dient de inname van bloedverdunnende middelen gestopt te worden (bv. Marcoumar®, Sintrom®, Ticlid®, Aspirine®, Plavix®,...). Gelieve dit zeker op voorhand te bespreken met uw huisarts. U hoeft niet nuchter te zijn. Uw thuismedicatie mag u ook innemen.

Gelieve vooraf aan uw arts te melden indien u:

- Last heeft van allergie voor medicijnen, contrastvloeistof of jodium;
- Lijdt aan suikerziekte of een hartkwaal;
- Bloedverdunnende medicatie inneemt;
- Mogelijks zwanger bent.



Hoe wordt de PRF uitgevoerd

In de operatiezaal wordt een naald onder röntgendoorlichting bij de zenuwwortel geplaatst, die wordt behandeld met radiofrequente stroom.

Hierdoor wordt een blokkade gemaakt van de pijngeleide zenuwen om de pijn die vanuit de wervelkolom uitstraalt naar hoofd, arm, romp of been te verminderen.

Deze behandeling (inclusief voorbereiding waarbij een infuus geplaatst wordt) duurt ongeveer een half uur en gebeurt onder lokale verdoving aangevuld met een lichte sedatie.

Na de behandeling moet u voor controle nog minstens 1 uur in het ziekenhuis blijven. Terug op de dagkliniek worden dan de verdere afspraken gemaakt voor bijkomende behandelingen of voor consultatie. Uw totale verblijf in het ziekenhuis zal enkele uurtjes in beslag nemen.

Na de PRF behandeling is het ten stelligste afgeraden uw voertuig zelf te besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt. Daarom is het niet toegestaan om zelf met de wagen te rijden. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.