

Risico's of nevenwerkingen

- Allergische reactie: meestal ontstaat enkel lokale roodheid, zwelling en jeuk
- Tijdelijke gevoelsvermindering van de huid in de buurt van de behandelende facetgewrichten. Aanraking bij douchen, wassen de haren kammen, geeft hierbij soms een vreemde gewaarwording. In de loop van de volgende weken zal het gevoel vanzelf terugkeren.
- Spierpijn thv de prikplaats / lokale bloeding
- Tijdelijke krachtsvermindering in de arm of het been: dit komt door de verdoving en kan enkele uren aanhouden. Wees voorzichtig dat u niet valt, vraag indien nodig hulp.
- Uiterst zelden treedt een inwendige bloeding op die verlamningsverschijnselen of gevoelsverlies kan geven. Contacteer ons dan dringend.

Contact

Heeft u nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen met:

secretariaat pijnkliniek:

T+ 32 (0)50 535 157

spoedgevallen Knokke-Heist:

T + 32 (0)50 535 112

spoedgevallen Blankenberge:

T + 32 (0)50 534 112



Facetdenervatie



campus Knokke-Heist (8300)

Kalvekeetdijk 260 - T +32 (0)50 535 000

campus Blankenberge (8370)

Dr. F. Verhaeghestraat 1 - T +32 (0)50 534 000

campus Maldegem (9990)

Brugse Steenweg 183E - T +32 (0)50 533 000

www.azzeno.be

AS0002646/VZ108



Facetdenervatie

Facetdenervatie is de behandeling van de steungewrichtjes van de wervelkolom.

(of percutane behandeling met continue toegediende radiofrequente elektrische stroom ter hoogte van de bezenuwing van de facetgewrichten)

Deze folder geeft u informatie over de behandeling van pijnklachten die uitgaan van de steungewrichtjes (facet) in de wervelkolom. Dit gebeurt door de zenuwbanen op die plaats te verwarmen met radiofrequente (RF) elektrische stroom. De behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de nek, borstwervel of lage rug.

Vorbereiding

De facetdenervatie vindt steeds plaats op de campus Knokke. Na opname begeeft u zich naar de dagkliniek.

U wordt best vergezeld van een chauffeur. Na de behandeling is het mogelijk dat u zich suf voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan om nadien zelf met de auto te rijden.

Maximaal 10 dagen op voorhand dient de inname van bepaalde bloedverdunnende middelen gestopt te worden (bv. Marcoumar®, Sintrom®, Ticlid®, Aspirine®, Plavix®,...). Gelieve dit zeker op voorhand te bespreken met uw arts.

U hoeft niet nuchter te zijn. Uw thuismedicatie mag u ook innemen.

Gelieve vooraf aan uw arts te melden indien u:

- Last heeft van allergie voor medicijnen, contrastvloeistof of jodium;
- Lijdt aan suikerziekte of een hartkwaal;
- Bloedverdunnende medicatie inneemt;
- Mogelijks zwanger bent.

Behandeling

Voorafgaand aan de facetdenervatie kreeg u een proefinfiltratie die de diagnose bevestigde, maar ook snel uitgewerkt was. De facetdenervatie zal voor een langdurig effect zorgen.

De behandeling gaat door in de operatiezaal. U ziet daar onder meer een speciale behandeltafel, een televisie-monitor en een röntgenapparaat (= Rx-stralen).

De arts ontsmet eerst de huid. Dit voelt koud aan. Vervolgens wordt de plaats van de behandeling steriel afgedekt. De arts verdooft de prikplaatsen (3) van de huid en onderhuidse weefsels. Deze injectie kan als prikkend ervaren worden. Als dit is ingewerkt, brengt de arts onder Rx-stralen de elektrode (een soort naaldje) in, vlak bij de zenuwtakjes van het facetgewricht.

Daarna wordt door de elektrode een zwakke, niet schadelijke elektrische stroom gestuurd. Daardoor ervaart u tintelingen of een drukkend gevoel. Het is van belang dat u met woorden de locatie aangeeft, dus niet de plaats aanwijzen anders maakt u deze onsteriel.

Vervolgens wordt de plaats van de elektrode ten opzichte van de zenuwen voor de spieren gecontroleerd. Dit gebeurt met een andere stroom. Hierdoor ontstaan spierbewegingen (kloppende gevoel) in uw arm of uw been. Wanneer de elektrode zich op de juiste plaats bevindt (soms is er een correctie van de positie nodig) begint de echte behandeling.

Via de ingebrachte elektrode wordt een hoogfrequente elektrische stroom gestuurd. Deze behandeling duurt enkele minuten. Nadien wordt het naaldje en de elektrode verwijderd.

Tijdens de hele procedure blijft de verpleegkundige bij u.

Na de behandeling

Na de behandeling moet u voor controle nog minstens 1 uur in het ziekenhuis blijven. Terug op de dagkliniek worden dan de verdere afspraken gemaakt voor bijkomende behandelingen of voor consultatie. Uw totale verblijf in het ziekenhuis zal enkele uren in beslag nemen.

Met deze behandeling ontstaat een pijnstilling door het elektrisch beïnvloeden van de zenuw. Er kan de eerste 2-3 weken na de facetdenervatie wat pijn zijn door de behandeling. Hiervoor kan u een lichte pijnstiller innemen. Het pijnstillend effect van de behandeling ontstaat meestal na 2 à 3 weken. Uw normale activiteiten mag u de volgende dag hervatten.