

Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad

- Het vaccin is *doeltreffend* (als er 2 dosissen gegeven worden)
- *Vergemeende vaccinatie* wordt momenteel *niet aangeraden*
 - Uit vrees dat het aantal vaccinaties voor mazelen-bof-rubella zou afnemen
 - Wegens de nood aan een vergemeend vaccinatieprogramma (ook bij oudere kinderen) om te vermijden dat windpokken verschuift naar oudere leeftijdsgroepen.
- Op *eigen vraag* kan een Varicella vaccinatie zeker toegediend worden.
- Vaccinatie is wel *aangeraden* bij:
 - Niet-immune personen in nauw contact met verzwakte personen en met jonge kinderen.
 - Niet-immune gezondheidsmedewerkers.
 - Niet-immune vrouwen met zwangerschapswens.

Vaccinatieschema

Te starten vanaf 1 jaar. 2 dosissen zijn noodzakelijk.

Kostprijs

- Varilrix 48,89 euro per dosis
- Varivax 52,52 euro per dosis

Deze vaccins zijn met een voorschrift van de arts aan te kopen bij de apotheek.

Mogelijke bijwerkingen van het vaccin

- Pijn, roodheid thv de injectieplaats (1/3)
- Koorts
- Huiduitslag



campus Knokke-Heist (8300)

Kalvekeetdijk 260 - T +32 (0)50 535 000

campus Blankenberge (8370)

Dr. F. Verhaeghestraat 1 - T +32 (0)50 534 000

campus Maldegem (9990)

Brugse Steenweg 183E - T +32 (0)50 533 000

www.azzeno.be



Vaccinaties

aanvullend op het schema van Kind en Gezin



A50003902/V2110

Vaccinaties

aanvullend op het schema van Kind en Gezin

Het is belangrijk om je kind te laten vaccineren. Zo bescherm je niet enkel je kind, maar ook je gezin en omgeving.

Naast het klassieke vaccinatieschema aangeraden door Kind en Gezin bestaan er nog een aantal andere vaccins waarvoor u bij de kinderarts terecht kan.

Vaccinatie tegen Meningococcon type B

Het basisvaccinatieschema van Kind en Gezin bevat reeds een vaccin tegen Meningococcon type C. Sinds de invoering van dit vaccin zagen we een forse daling van de Meningococcon C-infecties. De laatste jaren is er een overwicht van het B-type en zijn ook de W- en Y-types aan een opmars bezig. De Hoge Gezondheidsraad adviseert nu reeds om het type C-vaccin te vervangen door het type ACWY-vaccin (op eigen kost, 52,60 euro, gebeurt bij Kind en Gezin).

De Meningococcon B-bacterie komt bij 10 à 30% van de bevolking voor in de keel zonder ziekteklachten (*asymptomatisch dragerschap*). Ze kan worden overgedragen via speekseldruppels en zo verder het lichaam binnen dringen (*invasieve infectie*). Dit kan een *snel verloop* hebben en kan leiden tot *ernstige complicaties* zoals:

- Meningitis (hersenvliesontsteking)
- Sepsis (bloedvergiftiging)

Deze invasieve infecties zijn *zeldzaam*: ze komen in België ongeveer bij 1/100.000 personen per jaar voor. Maar zelfs met een correcte antibiotica-behandeling is er kans op *overlijden* (7.5%).

De overlevenden hebben 10 à 20% kans op blijvende *restletsels*:

- Hersenschade
- Gehoorverlies

- Amputatie lidmaat
- Verminderde nierfunctie

Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad

- Het 4cMen B vaccin is *doeltreffend* en *veilig*.
- *Systematische vaccinatie* van zuigelingen en jongeren wordt *niet aangeraden* omdat het effect van vaccinatie op dragerschap en op het voorkomen van Meningococcon B-infecties binnen de totale bevolking nog onvoldoende gekend is.
- Wil je toch *jezelf of je kind beschermen* dan kan het vaccin toegediend worden vanaf de leeftijd van 2 maanden. Bij voorkeur gebeurt dit bij *kinderen (0-5 jaar) en jongeren (15 – 19 jaar)*, omdat bij hen de ziekte het meest voorkomt.
- Vaccinatie is *aangeraden* bij alle personen (ongeacht hun leeftijd) met een *verminderde immuniteit*.

Kostprijs

- 86,52 euro per toediening. Met een voorschrift van de arts aan te kopen bij de apotheek.
- Vaccinatieschema (afhankelijk van de leeftijd waarop gestart wordt):
 - 2-23 maanden: 3 dosissen
 - Vanaf 2 jaar: 2 dosissen

Mogelijke bijwerkingen van het vaccin

- Bij zuigelingen en kinderen onder 2 jaar
 - Regelmatig: roodheid en gevoeligheid thv de injectieplaats, prikkelbaarheid, koorts.
 - Soms: stuipen, eczeem, netelroos.
 - Zelden: ontsteking van de bloedvatwand.

Deze bijwerkingen zijn *heviger* indien het vaccin *samen met routinevaccins* wordt gegeven. We raden daarom aan om vóór de toediening van het vaccin een dosis *Paracetamol* te geven en nadien nog 2 dosissen met een interval van 4 à 6h.

- Bij jongeren
 - Hoofdpijn, spierpijn, onwel zijn, pijn thv de injectieplaats.

Vaccinatie tegen windpokken (Varicella Zoster)

Besmetting met het *Varicella-virus* veroorzaakt windpokken, een ziektebeeld met:

- Koorts
- Blaasjes op de huid
- Zweetjes op de slijmvliezen

Na een doorgemaakte infectie is je kind *levenslang immuun*. Wel blijft het virus sluimerend aanwezig in het lichaam, kan het terug actief worden en *zona (gordelroos)* veroorzaken.

Wind (of water-)pokken komt frequent voor en heeft *meestal een goedaardig verloop*.

In een *klein aantal* gevallen kunnen *complicaties* voorkomen:

- Belangrijke littekenvorming
- Bacteriële bijbesmetting van de huid
- Longontsteking
- Encefalitis (ontsteking van het hersenweefsel)
- Overlijden (In België 1 à 2 sterfgevallen/jaar)

De meeste verwikkelingen en *hospitalisaties* komen voor bij voordien *gezonde kinderen*.

Zuigelingen, volwassenen en personen met verminderde immuniteit hebben een grotere kans op een *ernstig verloop*.

Infectie tijdens de *zwangerschap* kan bij de baby leiden tot huid-, hersen-, oogafwijkingen, onderontwikkelde ledematen,...

