

BEREIDING EN TOEDIENING VAN **FIRMAGON®**

EEN MET OPLOSMIDDEL VOORGEVULDE SPUIT VOOR EEN VEREENVOUDIGDE BEREIDING



- 1
- Haal de flaconadapter uit de verpakking.
 - Maak de adapter vast aan de flacon met poeder door de adapter naar beneden te drukken totdat de punt door de rubberen dop van de flacon wordt geduwd.



- 2
- Schroef de zuiger vast op de spuit.
 - Haal het dopje van de voorgevulde spuit.



- 3
- Maak de spuit vast aan de poederflacon door deze op de adapter te draaien.
 - Breng al het oplosmiddel over in de poederflacon.




- 4
- Draai de flacon voorzichtig rond terwijl de spuit nog steeds aan de adapter zit, totdat de vloeistof helder en zonder onopgelost poeder of deeltjes is.



- 5
- Draai de flacon ondersteboven en trek vloeistof op tot aan de markering op de injectiespuit.
 - **Verzekert u er altijd van het exacte volume op te trekken (tot aan de lijnmarkering).**



- 6
- Haal de spuit van de flaconadapter.
 - Zet de naald voor diep subcutane injectie op de spuit.



- 7
- Injecteer in één van deze vier quadranten
 - Injecteer niet op plaatsen waar de patiënt aan druk wordt blootgesteld.



- 8
- Dien een **diep subcutane** injectie toe.
 - Injecteer **langzaam** 3 ml voor de 120 mg en 4 ml voor de 80 mg direct na reconstitutie.*
 - Wacht ten minste **20 seconden** alvorens de naald terug te trekken.

- Herhaal de oplosprocedure voor de tweede dosis. Kies een andere injectieplaats en **injecteer 3 ml**.