

Risico's of nevenwerkingen

- Tijdelijke nabehandelpijn (gedurende enkele dagen tot tweetal weken). Hiervoor mag u klassieke pijnstillers nemen.
- Gevoelsvermindering ter hoogte van het huidgebied van de behandelde zenuw(wortel). Dit verdwijnt meestal na een aantal maanden.
- Lokale bloeding
- Allergische reactie: meestal ontstaat enkel lokale roodheid, zwelling en jeuk.
- Spierpijn t.h.v. de prikplaats.
- Tijdelijke krachtsvermindering in de arm of het been: dit komt door de verdoving en kan enkele uren aanhouden. Wees voorzichtig dat u niet valt, vraag indien nodig hulp.
- Uiterst zelden treedt een inwendige bloeding op die verlamingsverschijnselen of gevoelsverlies kan geven. Contacteer ons dan dringend.

Resultaten

Het uiteindelijke resultaat kan pas definitief beoordeeld worden na minstens vier weken.

Afhankelijk van patiënt tot patiënt, en afhankelijk van welke structuur behandeld werd, treedt pijnstilling op die varieert van een paar maanden tot meer dan een jaar. Wanneer na verloop van tijd de klachten opnieuw optreden, kan de behandeling herhaald worden.

Contact

Heeft u vragen, aarzel niet om contact op te nemen met:

secretariaat pijnliniek

T + 32 (0)50 535 157

spoedgevallen Knokke-Heist

T + 32 (0)50 535 112

spoedgevallen Blankenberge

T + 32 (0)50 534 112



campus Knokke-Heist (8300)

Kalvekeedijk 260 - T +32 (0)50 535 000

campus Blankenberge (8370)

Dr. F. Verhaeghestraat 1 - T +32 (0)50 534 000

campus Maldegem (9990)

Brugse steenweg 183E - T +32 (0)50 533 000

www.azzeno.be



Gepulseerde radio-frequente zenuwblokkade

A50002881/V2108



Gepulseerde radiofrequente zenuwblokkade

U krijgt binnenkort een PRF als behandeling van een zenuw(wortel) in de rug (lumbaal) of de nek (cervicaal). Met deze tekst willen we u wat meer uitleg geven over dit type pijnbehandeling.

Wat is een PRF

PRF staat voor 'Pulse Radio Frequentie stroom'. Hierbij wordt de zenuw(wortel) verwarmd tot maximaal 42°C. Bedoeling is om de geleiding van de zenuwprikkel te beïnvloeden. De zenuw wordt niet beschadigd.

Radiofrequente stroombehandelingen worden pas uitgevoerd nadat eerst een duidelijke (tijdelijke) pijnverbetering heeft plaatsgevonden na een proefbehandeling. Dit betekent dat er eerst een proefbehandeling voorafgaat aan de PRF. Indien er beterschap optreedt na deze proefbehandeling, wordt de effectieve PRF binnen de drie maanden uitgevoerd.

Vorbereiding

De PRF vindt steeds plaats op de campus Knokke. Na opname begeeft u zich naar de dagkliniek. Maximaal 10 dagen op voorhand dient de inname van bepaalde bloedverdunnende middelen gestopt te worden (bv. Marcoumar®, Sintrom®, Ticlid®, Aspirine®, Plavix®,...). Gelieve dit zeker op voorhand te bespreken met uw arts. U hoeft niet nuchter te zijn. Uw thuismedicatie mag u ook innemen.

Gelieve vooraf aan uw arts te melden indien u:

- Last heeft van allergie voor medicijnen, contrastvloeistof of jodium;
- Lijdt aan suikerziekte of een hartkwaal;
- Bloedverdunnende medicatie inneemt;
- Mogelijks zwanger bent.



Hoe wordt de PRF uitgevoerd

In de operatiezaal wordt een naald onder röntgendoorlichting bij de zenuwwortel geplaatst, die wordt behandeld met radiofrequente stroom. Hierdoor wordt een blokkade gemaakt van de pijngeleide zenuwen om de pijn die vanuit de wervelkolom uitstraalt naar hoofd, arm, romp of been te verminderen.

Deze behandeling (inclusief voorbereiding waarbij een infuus geplaatst wordt) duurt ongeveer een half uur en gebeurt onder lokale verdoving aangevuld met een lichte sedatie.

Na de behandeling moet u voor controle nog minstens 1 uur in het ziekenhuis blijven. Terug op de dagkliniek worden dan de verdere afspraken gemaakt voor bijkomende behandelingen of voor consultatie. Uw totale verblijf in het ziekenhuis zal enkele uurtjes in beslag nemen.

Na de PRF behandeling is het ten stelligste afgeraden uw voertuig zelf te besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt. Daarom is het niet toegestaan om zelf met de wagen te rijden. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.