

AFSPRAAK

Datum:..... Uur:.....

nuchter

niet nuchter

AANVRAAGFORMULIER MRI ONDERZOEK

Een apart aanvraagformulier per klinische vraagstelling is vereist" KB.19.12.2012

IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT (invullen of etiket)

Naam		
Geboortedatum/...../.....		
Geslacht	<input type="checkbox"/> Man	<input type="checkbox"/> Vrouw

RELEVANTE KLINISCHE INLICHTINGEN

--

DIAGNOSTISCHE VRAAGSTELLING

--

VOORGESTELD ONDERZOEK

--

RELEVANTE BIJKOMENDE INFORMATIE

<input type="checkbox"/> MRI contrastallergie	<input type="checkbox"/> (Mogelijke) zwangerschap
<input type="checkbox"/> Prothese na amputatie	<input type="checkbox"/> Geen anamnese mogelijk
<input type="checkbox"/> Ingrepen in gevraagde regio:.....	
<input type="checkbox"/> Geen	

VORIGE RELEVANTE ONDERZOEKEN in verband met deze diagnostische vraagstelling

<input type="checkbox"/> RX	<input type="checkbox"/> CT	<input type="checkbox"/> ECHO	<input type="checkbox"/> MRI	<input type="checkbox"/> Geen	<input type="checkbox"/> Andere:.....
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

MOGELIJKE CONTRA INDICATIES VOOR MRI 3T

<input type="checkbox"/> Pacemaker, defibrillator	<input type="checkbox"/> Metaalsplinter in het oog
<input type="checkbox"/> Neurostimulator	<input type="checkbox"/> Morfine-/ insulinepomp
<input type="checkbox"/> Cochleair implant	<input type="checkbox"/> Metalen cerebrale aneurysma clips
<input type="checkbox"/> Geen	<input type="checkbox"/> Prothesemateriaal < 6 weken post- op

NIERFUNCTIE RELEVANT BIJ IV GADOLINIUMTOEDIENING

AANVRAGENDE ARTS

<p>Voorafgaande controle van de nierfunctie (eGFR) is niet meer noodzakelijk bij toediening van gadoliniumhoudend contrastmiddel. Enkel bij het kort op elkaar herhalen van IV contrast raden we aan om de eGFR te controleren (binnen 7 dagen tussen 2 gadoliniumhoudende onderzoeken).</p> <p><input type="checkbox"/> eGFR bepaling wel noodzakelijk</p> <p>eGFR:.....ml/min/1,73m² Datum afname:../.../...</p>	<p>Ik, ondertekenende dokter, bevestig dat ik bovengenoemde patiënt onderzocht heb en geen contra-indicaties voor dit MRI-onderzoek heb gevonden.</p> <p>Datum, handtekening en stempel met vermelding van naam, voornaam, adres en RIZIV-nummer</p>
---	--

Schema nierbeleid GADOLINIUM IV contrast - MRI

Voorafgaande controle van de nierfunctie (eGFR) is niet meer noodzakelijk bij toediening van gadoliniumhoudend contrastmiddel, dankzij het gebruik van moderne, veilige contraststoffen. Enkel bij het kort op elkaar herhalen van IV contrast raden we aan om de eGFR te controleren.

Heeft de patiënt in de voorbije 7 dagen een MR-onderzoek gekregen met contrast vloeistof?

Nee: Geef IV contrast

Heeft de patiënt 1 van onderstaande risicofactoren?

- Nierproblematiek
 - Chronische of acute nierinsufficiëntie
 - Gebruik van nefrotoxische medicatie
 - Nieroperatie - transplantatie
 - Albuminurie
- Diabetes mellitus / metformine gebruik

Nee: Geef IV contrast

Ja: er is een eGFR nodig, max. 24u oud

eGFR \geq 30	OK, geef IV contrast
eGFR < 30	Tracht een interval van 7 dagen te respecteren tussen 2 contrast mri onderzoeken zo mogelijk, bespreek dit steeds met de radioloog
Dialyse patiënt	Altijd in overleg met nefroloog & radioloog – planning dialyse na het onderzoek.

Tijdsinterval tussen 2 contrastonderzoeken

- MRI + MRI = 24 u maar indien egr <30 = 7 dagen
- Overige combinaties (MRI + CT, CT + MRI, CT + CT) = 24 u