

De intracaverneuze injectie van de penis.


Erectiestoornissen

Erectiestoornissen of erectiele dysfunctie is het consistente/herhaaldelijke onvermogen om een erectie op te wekken/te behouden die voldoende goed is om seksueel actief te kunnen zijn. Heel wat mannen lijden aan deze aandoening. De aandoening kan zich uiten op verschillende leeftijden en is dus niet steeds het gevolg van 'de ouderdom'. Een studie in de Verenigde staten (De Olmstead County studie) gaf aan dat zelfs in de leeftijdsgroep van 40 – jarigen er bijna 13% van de mannen lijden aan erectiestoornissen. Vanaf de leeftijd van 60 jaar gaat dit naar de 20%. De oorzaken zijn divers en worden grofweg ingedeeld in psychologische oorzaken en lichamelijke oorzaken. Voorbeelden van psychologische oorzaken zijn relatieproblemen, stress op het werk etc. Voorbeelden van lichamelijke oorzaken zijn afwijkingen van de bloedvaten die de penis bevloeien en de zenuwen die de penis bezenuwen. Elk van deze factoren of een combinatie van deze factoren veroorzaakt bij U vermoedelijk de erectiestoornissen.

Anatomie van de penis

De penis bestaat uit de plasbuis en twee zwellichamen die ook wel corpora cavernosa

genoemd worden. De plasbuis bevindt zich aan de onderkant van de penis en deze dient om de urine naar buiten af te voeren. Deze plasbuis is omringd door een sponsachtig steunweefsel dat eindigt op de eikel van de penis. Overheen de eikel van de penis zit de voorhuid. De twee zwellichamen zijn lange cilindervormige structuren die zich bevinden aan de bovenzijde van de penis. Deze cilinders zijn sponsachtige bloedvaten omringd door een stevig kapsel. Bij een erectie voelden deze cilinders hard aan omdat bloed onder druk komt te staan binnenin het stevige kapsel.




Bron foto: www.centrumvoorurologie.nl

Intracaverneuze injecties

Intracaverneuze injecties betekent het injecteren van een vaatverwijdende stof in het corpus cavernosum. Hiervoor wordt een zeer fijne

naald gebruikt. De vaatverwijdende stof noemt papaverine. Door injectie van deze stof zullen de sponsachtige bloedvaten van het zwellichaam zich vullen met bloed en zal U binnen enkele minuten een erectie krijgen. (maximaal effect na 15 minuten) Deze erectie zal afhankelijk van de ingespoten dosis onvoldoende of voldoende zijn. Zelden zal deze dosis te hoog zijn. Een voldoende goede erectie is een erectie die niet pijnlijk is en die na betrekking geleidelijk aan terug slap zal worden. De erectie is onvoldoende indien penetratie bij uw partner niet mogelijk is of wanneer de erectie onmiddellijk wegvalt zonder dat U tot een orgasme kan komen. In dat geval zal uw uroloog zo mogelijk de dosis van het geneesmiddel opdrijven. Een te hoge dosis is een dosis waarbij de penis constant in erectie blijft staan en pijnlijk wordt. Er wordt dan ook altijd geadviseerd bij een erectie die langer dan 4 u aanhoudt contact op te nemen met de dienst urologie.



Bron foto: www.acanadianhealthcaremall.com


Kennismaking met het product en aanleren van de inspuiting

Indien U aan uw arts aangeeft dat U de inspuitingen wil testen zal hij met U een datum afspreken om deze injectie te plaatsen. Er zal een voorschrift voorzien worden zodat U de medicatie kunt halen in de thuisapotheek.

De dag van de eerste injectie draagt U best een spannende onderbroek. De arts zal U tonen hoe U de injectie dient te plaatsen. Het is belangrijk dat de injectie gebeurt in de zijkanten van de penis. Injectie thv de bovenkant van de penis of de onderkant van de penis (waar de plasbuis zit) is niet aangewezen. Voorkom ook injectie in zichtbare bloedvaten op de penishuid. De arts zal de injectie de eerste keer zelf plaatsen. Na de injectie kan U even plaatsnemen in de wachtzaal. Best plaatst U de penis naar boven toe tegenaan de onderbuik. Even later zal de arts U weer binnen roepen voor het beoordelen van het effect. Nadien kan U naar huis vertrekken en desgewenst kan U ook met uw partner afspreken om te zien of deze injectie voldoende resultaat gaf om te kunnen vrijen. Er zal een voorschrift voorzien worden

zodat U de medicatie kunt halen in de apotheek.

De dag van de tweede injectie zal U of uw partner deze injectie zelf moeten plaatsen. De arts zal U hierbij begeleiden. Indien dit vlot gaat bent U vertrokken. De arts zal een voorschrift voorzien zodat U de medicatie kunt halen in de apotheek.



Praktische tips:

- Voorkom injectie in zichtbare bloedvaten of in de onderkant van de penis, omdat hierdoor bloedingen op kunnen treden.
- Probeer afwisselend aan de linker en de rechter kant van uw penis te injecteren.
- Controleer uw penis regelmatig eens op verhardingen en/of kromstand van de penis.
- Gebruik dit middel maximaal 2 x per week
- Indien U bloedverdunnende medicatie neemt bespreekt U dit best met uw arts. Sommige middelen zijn niet te combineren met intracaverneuze injecties.
- Roken vanaf een uur voor de injectie wordt afgeraden, omdat dit de werking negatief kan beïnvloeden. Overmatig gebruik van alcohol samen met deze injecties is ook afgeraden.
- Gebruik nooit een hogere dosis dan die door uw uroloog voorgesteld. In geval de injectie niet goed gelukt is mag U niet proberen een tweede injectie te plaatsen diezelfde dag.

Contact

Indien u nog vragen hebt kan u steeds contact opnemen met onze urologische verpleegkundigen of onze artsen. Wij kunnen u niet altijd meteen te woord staan wanneer wij andere patiënten helpen met een consultatie of een operatie. Voor sommige zaken te bespreken passeert u ook beter op de consultatie urologie op afspraak. Voor echt dringende zaken contacteert u onze dienst spoedgevallen die ons zullen verwittigen van uw probleem.

Campus Knokke-Heist Kalvekeetdijk 260, 8300 Knokke-Heist
Algemeen: +32 (0)50 535 000

Campus Blankenberge Dr. F. Verhaeghestraat 1, 8370 Blankenberge
Algemeen: +32 (0)50 534 000

Campus Maldegem Brugse Steenweg 183E, 9900 Maldegem
Algemeen: +32 (0)50 533 000



- Lees de bijsluiter van de medicatie voor informatie over klaarmaken van de injectiespuit.

te goed zou reageren op de medicatie. Indien de erectie dus langer dan 4 uur aanhoudt en pijnlijk wordt neemt U onmiddellijk contact op met uw uroloog.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kunnen injecties in de penis bijwerkingen veroorzaken

- Sommige patiënten vermelden bij regelmatig gebruik het optreden van een verharding op de penis. Meestal verdwijnt dit spontaan. Indien pijnlijk of gepaard met een kromstand neemt U best contact op met uw uroloog.
- Soms kan er een beperkte bloeduitstorting of roodheid te zien zijn op de plaats van de injectie in uw penis. Dit is niet abnormaal en zal vanzelf over gaan. Injecteer de volgende keer aan de andere kant.
- Indien U last zou krijgen van duizeligheid of een allergische reactie zou ervaren meldt U dit best aan uw uroloog. Dan is deze medicatie voor U niet aangewezen.
- Zeer belangrijk is dat U tijdig reageert indien U

Contact

Indien u nog vragen hebt kan u steeds contact opnemen met onze urologische verpleegkundigen of onze artsen. Wij kunnen u niet altijd meteen te woord staan wanneer wij andere patiënten helpen met een consultatie of een operatie. Voor sommige zaken te bespreken passeert u ook beter op de consultatie urologie op afspraak. Voor echt dringende zaken contacteert u onze dienst spoedgevallen die ons zullen verwittigen van uw probleem.

Campus Knokke-Heist Kalvekeetdijk 260, 8300 Knokke-Heist
Algemeen: +32 (0)50 535 000

Campus Blankenberge Dr. F. Verhaeghestraat 1, 8370 Blankenberge
Algemeen: +32 (0)50 534 000

Campus Maldegem Brugse Steenweg 183E, 9900 Maldegem
Algemeen: +32 (0)50 533 000